



## Pomocný prostředek pro ochranu rostlin Myco-Sin<sup>®</sup> VIN

Pomocný prostředek pro posílení odolnosti rostlin proti chorobám.

**Formulace:** prášková látka s neškodnými příměsemi

**Účinné složky:** Síran hlinitý tetradekahydrát 740 g/kg, deaktivované mleté sušené kvasnice 100 g/kg, extrakt přesličkový suchý 10 g/kg, extrakt šalvějový suchý 40 g/kg

**POZOR!**



**Nebezpečí vážného poškození očí!**

**Uchovávejte mimo dosah dětí.**

**Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.**

**Nejezte, nepijte, nekuřte při používání.**

**Dráždivý** Zamezte styku s očima.

**Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.**

**Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.**

**Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.**

**Zabraňte kontaminaci vody prostředkem nebo jeho obalem. /Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody. /Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest.**

**Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.**

Prostředek je nehořlavý.

Pro včely je relativně neškodný.

**Držitel rozhodnutí o registraci/Dodavatel:** BIOCONT LABORATORY spol. s r.o., Šmahova 66, 627 00 Brno – Slatina, Tel/fax: 545 218 156

**Výrobce:** Dr. Schaette AG, Stahlstrasse 5, 88339 Bad Waldsee, Německo, Tel. 07524/4015- 0

**Registrační č.:** 1700-0C

**Číslo šarže:**

**Použitelné do:**

**Balení:** 1 kg; 10 kg; 25 kg

**Působení:** Myco-Sin<sup>®</sup> VIN působí jako preventivní ošetření před napadením houbovými chorobami. Zvýšením produkce fenolických sloučenin, zpevněním povrchu listů, zabráněním prorůstání spór kutikulou a změnou pH na listech - omezení klíčení spór. Díky těmto vlivům dochází k omezení napadení rostliny.

### Návod k použití:

Doporučené použití pomocného prostředku Myco-Sin<sup>®</sup> VIN

| Plodina   | Účel použití               | Dávka       | OL | Poznámka  |
|-----------|----------------------------|-------------|----|---|
| Réva      | posílení odolnosti rostlin | 3 – 8 kg/ha | 0  | plíseň révová<br>1  |
| Jádroviny | posílení odolnosti rostlin | 0,5 – 1 %   | 0  | moniliová hniloba, ostatní hniloby plodů, strupovitost<br>2 |
| Peckoviny | posílení odolnosti rostlin | 0,5 – 1 %   | 0  | moniliová hniloba, ostatní hniloby plodů<br>2               |
| Brambor   | posílení odolnosti rostlin | 0,5 – 1 %   |    | plíseň bramborová<br>3                                      |
| Rajče     | posílení odolnosti rostlin | 0,5 – 1 %   | 0  | plíseň bramborová<br>3                                      |

### Aplikace:

Doba aplikace: preventivně před rozšířením infekce, optimálně 1-2 dny před deštěm.

Aplikace v intervalu 7 – 10 dnů dle infekčního tlaku.

Dávka aplikační kapaliny: podle aplikačního zařízení.



**Poznámky:**

1) První aplikace začíná ve fázi 5 listů, další pokračují dle potřeby.

Způsob aplikace: Dávka aplikační kapaliny 300 – 600 l/ha.

Dávka aplikační kapaliny se zvyšuje s velikostí listové plochy v průběhu vegetace.

2) Doporučená dávka aplikační kapaliny 300 – 1000 l/ha.

3) Doporučená dávka aplikační kapaliny 400 – 600 l/ha.

**Mísitelnost přípravků:** Myco-Sin<sup>®</sup> Vin není možno míchat s přípravky se zásaditou reakcí - měďnaté přípravky, preparáty na bázi vodního skla (Aqua Vitrin K, Oikomb) a s některými přípravky na bázi síry (např. Kumulus WG, Sulikol 750SC, podrobnější informace žádejte u dodavatele).

Myco-Sin<sup>®</sup> Vin je možno kombinovat s přípravky na bázi *Bacillus thuringiensis*, rostlinnými extrakty a s přípravkem Sulikol K.

**Příprava aplikační kapaliny:** Myco-Sin<sup>®</sup> Vin rozmíchejte v malém množství vody. Teprve potom přidejte plnou dávku vody. Postřikovou kapalinu promíchejte průběžně během aplikace.

**Čištění aplikačního zařízení:** Aplikační zařízení po ukončení práce vypláchněte 3 % roztokem sody a poté čistou vodou. V případě čisticích prostředků postupujte dle návodu k jejich použití.

**Skladování:** Myco-Sin<sup>®</sup> Vin se uchovává v originálních obalech při teplotě 10-30 °C, v suchých chladných místnostech. Uchovávejte odděleně od skladovaných potravin, nápojů a krmiv. Skladovatelnost přípravku min. 2 roky.

**Likvidace obalů a zbytků:** Zbytky aplikační jíchy se zředí a vystříkají na ošetřovanou plodinu.

Vypláchnuté obaly mohou být likvidovány jako běžný odpad. Použité odpady se dále nepoužívají. Pokud nelze provést dekontaminaci obalů vypláchnutím, kontaminované obaly se spálí. Zbytky přípravku eventuálně aplikační jíchy se nesmí likvidovat či vylévat v blízkosti zdrojů pozemních vod a recipientů povrchových vod. Neupotřebitelné zbytky přípravku, resp. přípravky s prošlou záruční lhůtou se likvidují rovněž spálením ve schválené spalovně.

**Bezpečnostní opatření:** Při práci s Myco-Sin<sup>®</sup> Vin používejte vhodné OOPP.

Ochrana dýchacích orgánů: ústěnka z filtračního materiálu nebo polomaska filtračního materiálu (ČSN EN 149)

Ochrana očí a obličeje: uzavřené brýle nebo obličejový štít (ČSN EN 166)

Ochrana těla: protichemický ochranný oděv z textil. mat. (ČSN EN ISO 6529 a ČSN EN ISO 6530), zástěra z PVC nebo pogumovaného textilu

Ochrana hlavy: čepice se štítem nebo klobouk

Ochrana rukou: gumové rukavice (ČSN EN 374-1)

Ochrana nohou: gumové nebo plastové hlinky (ČSN EN 20346)

Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Zamezte styku s očima.

**První pomoc:**

**Všeobecné pokyny:** Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety či příbalového letáku. V případě potřeby lze další postup při první pomoci event. následnou terapii konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

**Nadýchání:** Postiženého přemístěte na čerstvý vzduch, zajistěte klidovou polohu.

**Zasažení očí:** Okamžitě důkladně vypláchněte oči velkým množstvím vody po dobu 15 minut.

**Zasažení pokožky:** Odstraňte zasažený oděv, omývejte velkým množstvím vody a mýdlem.

**Požítí:** Nevyvolávejte zvracení, podejte 0,5 l pitné vody a 10 tablet medicínálního uhlí. Nepodávejte žádné tekutiny ani nevyvolávejte zvracení je-li osoba v bezvědomí nebo má křeče! V případě náhodného požití a všech případech otravy či podezření na otravu neprodleně dopravit postiženého k lékaři a ukázat etiketu nebo bezpečnostní list tohoto prostředku – viz výše Všeobecné pokyny.

**Poznámky pro lékaře:** Produkt obsahuje síran hlinitý. Ten způsobuje toxické příznaky při dávce 2 g a více způsobením denaturace bílkovin. Zvracení může být nebezpečné kvůli vdechnutí. Ošetřujte dle symptomů jako otravu kyselinou. Sledujte dlouhodobé následky.