



Plán ochrany jabloní proti chorobám

			 Rašení květních pupenů BBCH 0-53	 Myší ouško BBCH 54	 Většina květů ve stádiu balónku BBCH 59	 Plné kvetení BBCH 65	 Po květu do stádia velikosti ořechu BBCH 71	 Plody velikosti vlašského ořechu BBCH 74	 Dozrávání plodů BBCH 75	 Sklizňová zralost plodů BBCH 87	 Opad listů
Choroba	Produkt	Dávka									
Strupovitost	síra	7,5 kg/ha	← preventivně →								
	VitiSan		← v době klíčení spór, kurativně 12 - 48 hod po infekci →								
Padlí	síra		← preventivně →								
Bakteriální spála	síra Flowbrix	0,6 - 2 l/ha	← preventivně →								
Černě	síra		← →								
Korové nekrózy	Flowbrix	1,75-3,5 l/ha	← →								
Výživa	Free N100®, PK®	0,5 l/ha	← →								
	NUTRIGEO®L	40 l/ha	← →								
	VermiFit B	4-6 l/ha	← →								
	FERTIPEN® C		← →								
	SOLFERNUS O	0,3 - 1 %	← →								
	Hycol -E Ca	10l/ha	← →								
	Hycol - jádrovina	5l/ha	← →								
	SulfiCal	5-10 l/ha	← →								
	KALCIS	300-800 kg/ha	← 300-500 kg/ha →								
	Kalcium Pro List		← 400-800 kg/ha →								
Zlepšení smáčivosti	WETCIT®	0,1-0,2 %	← Pro zvýšení přilnavosti postřiku, mísitelné s běžnými postřiky. →								
	HELIOSOL®	0,2-0,5 %	← zvýšení homogenizace a smáčivosti postřiku, v kombinaci s registrovanými přípravky →								

Pozor na mísitelnost jednotlivých prostředků!

Plán ochrany jablek proti škůdcům

Škůdce	Produkt	Dávka								
			BBCH 0-53	BBCH 54	Většina květů ve stádiu balónku BBCH 59	BBCH 65	BBCH 71	BBCH 74	BBCH 75	BBCH 87
Svilušky, vlnovník	Dravý rotoč <i>Typhlodromus pyri</i>									
Obaleči	Isomate® C LR	1000 odp./ha								
	Lepinox® Plus	0,75–1 kg/ha								
Mšice	NeemAzal®-T/S	4,5 l/ha								
Obaleč jablečný	Isomate® C TT	1000 odp./ha								
	Lepinox® Plus	0,75–1 kg/ha								
	MADEX®, MADEX® Top	0,1 l/ha								
	SpinTor a SpinTor 240 SC	0,6 l/ha								
Zlepšení smáčivosti	WETCIT®	0,1–0,2 %								
	HELIOSOL®	0,2–0,5 %								

Pozor na mísitelnost jednotlivých prostředků!

Plán ochrany peckovin proti chorobám a škůdcům

Choroba škůdce	Produkt	Dávka	         									
			Rašení BBCH 0-51	Poupě BBCH 54	Květy ve stádiu balónu BBCH 59	Kvetení BBCH 65	Dokvétání BBCH 71	Tvorba plodů BBCH 74	Začátek vybarvování plodů BBCH 76	Zrání BBCH 78	Plná zralost BBCH 87	Opad listů
Hnědnutí listů meruňky	VitiSan	1,5–10 kg/ha	←→									
Kadeřavost broskvoně	Flowbrix	3,3 l/ha	←→									
Korové nekrózy	Flowbrix	1,75 - 3,5 l / ha	←→									
Pílatka švestková,	Výluh z pilin		←→									
Pídalka podzimní, makadlovka broskvoňová	Lepinox® Plus	0,75 - 1 kg/ha	←→ aplikace v době výskytu housenek									
Obaleč švestkový, obaleč východní	Isomate® OFM rosso FLEX	500 (300) odp./ha	←→ aplikace odparníků před začátkem náletu, působí po celou sezónu									
	Lepinox® Plus	0,75 - 1 kg/ha	←→ v době výskytu mladých housenek, dle signalizace									
Výživa	FREE N100®, PK®	0,5 l/ha	←→									
	NUTRIGEO® L	40 l/ha	←→ při teplotě půdy nad 6°C									
	VermiFit B	4-6 l/ha	←→ při teplotě půdy nad 6°C									
	FERTIPEN® C		←→									
	SOLFERNUS O	0,3 - 1 %	←→									
	Hycol - peckovina	5l/ha	←→									
	SulfiCal	5-10 l/ha	←→									
	KALCIS	300-800 kg/ha	←→									
Zlepšení smáčivosti	WETCIT®	0,1-0,2 %	←→ Pro zvýšení přilnavosti postřiku, mísitelné s běžnými postřiky.									
	HELIOSOL®	0,2-0,5 %	←→ Zvýšení homogenizace a smáčivosti postřiku, v kombinaci s registrovanými přípravky									

Pozor na mísitelnost jednotlivých prostředků!