

Drůbež

drobné domácí chovy



Řešení proti mouchám, čmelíkům a dalším ektoparazitům drůbeže.

✓ MACRO-MITE (dravý roztoč)

Aplikaci produktu MACRO-MITE (dravého roztoče) je třeba sladit s četností kompletní výměny podestýlky. Aplikaci je ideální provést nejlépe **ihned**, nejpozději několik dní **po výměně podestýlky** a neměla by se provádět týden před čištěním. Aplikovat přímo na podestýlku rovnoměrně po celé délce stěn, ve větší míře do rohů a ke sloupům.


Pokud se v blízkosti nachází hnojiště aplikovat produkt MACRO-MITE jednou na začátku sezony (květen) a v půlce sezony (červenec).

✓ LAPAČ APPIBUSTER (na dospělé)

Umístění lapače Appibuster ve vzdálenosti **10-20 metrů od ubikace**. Výměna návnady probíhá jednou za **30-60 dní**. Lapač je vhodné umístit na teplé místo na slunci ve výšce cca **1,5 metru**.


✓ SANDEZIA (suchá dezinfekce)

Při prvním použití **50 g/ m² denně po dobu 3 dnů**, a poté pokračovat jednou za týden. Produkt SANDEZIA je možno využít také při čištění a dezinfekci ubikací pro drůbež, je možné ji nasypat na zem před nastláním nebo po zředění vodou vystříkat stěny, podlahy atd.



MACRO-MITE
dravý roztoč

JEDNO BALENÍ: **250 m²**
MÍSTO : **podestýlka**
APLIKACE: **každé 2 až 4 týdny**



SANDEZIA
suchá dezinfekce

JEDNO BALENÍ: **50 g/m²**
MÍSTO : **kurník**
APLIKACE: **první 3 dny každý den, poté 1x týdně**



LAPAČ APPIBUSTER
lapač na dospělé

JEDNO BALENÍ: **200 m²**
MÍSTO : **vedle kurníku (10-20 m)**
APLIKACE: **výměna návnady každých 30 - 60 dní**