

Plán ochrany jabloní proti chorobám



Rašení květních pupenů

Myší ouško

Většina květů ve stádiu balónku

Plné kvetení

Po květu do stádia velikosti ořechu

Plody velikosti vlašského ořechu

Dozrávání plodů

Sklizňová zralost plodů

Opad listů

BBCH 0-53

BBCH 54

BBCH 59

BBCH 65

BBCH 71

BBCH 74

BBCH 75

BBCH 87

Choroba	Produkt	Dávka	
Strupovitost	síra VitiSan	dle dávkování a druhu přípravku 0,75% (75 g / 10 l vody)	← preventivně → ← v době klíčení spór, kurativně 12-48 hod po infekci →
Padlí	síra	dle dávkování a druhu přípravku	← preventivně →
Bakteriální spála	síra mědnatý postřik	dle dávkování a druhu přípravku	← preventivně →
Černě	síra	dle dávkování a druhu přípravku	← →
Korové nekrózy	mědnatý postřik	dle dávkování a druhu přípravku	← →
Výživa	Hycol -E Ca Hycol -jádrovina	1 % 0,5 %	← → ← →
Zlepšení smáčivosti	WETCIT®	0,1-0,2 %	← Pro zvýšení přilnavosti postřiku, mísitelné s běžnými postřiky. →

Pozor na mísitelnost jednotlivých prostředků!