

Plán ochrany jabloní proti škůdcům



Rašení květních pupenů **BBCH 0-53** Myší ouško **BBCH 54** Většina květů ve stádiu balónku **BBCH 59** Plné kvetení **BBCH 65** Po květu do stádia velikosti ořechu = citlivé na rzivost **BBCH 71** Plody velikosti vlašského ořechu **BBCH 74** Dozrávání plodů **BBCH 75** Sklízňová zralost plodů **BBCH 87**

Škůdce	Produkt	Dávka	Applikace
Svilušky, vlnovník	Dravý roztoč <i>Typhlodromus pyri</i>		<p>aplikace textilních pásků s přezimujícím stadiem <i>T. pyri</i></p> <p>dlouhodobá ochrana (<i>T. pyri</i> v sadu přezimuje)</p>
Obaleči	Lepinox® Plus	0,1% 10 g/10 l vody	<p>aplikace odparníků na začátku sezóny, před začátkem náletu obalečů</p> <p>Působí po celou sezónu. Účinkuje na obaleče jablečného, o. zimolezového, o. ovocného</p> <p>aplikace při výskytu mladých housenek</p>
Mšice	NeemAzal®-T/S	3 ml/10 m ² 0,5-0,8 l vody	<p>aplikace v období výskytu mladých housenek</p>
Obaleč jablečný	Lepinox® Plus	0,1% 10 g/10 l vody	<p>aplikace v době výskytu mladých housenek, dle signalizace</p>
Zlepšení smáčivosti	WETCIT®	0,1-0,2 %	<p>Pro zvýšení přilnavosti postřiku, mísitelné s běžnými postřiky.</p>

Pozor na mísitelnost jednotlivých prostředků!