


Postup aplikace




Diagnostika

Detekujte a sledujte přítomnost čmelíků ve Vašem kurníku pomocí lapače.



Léčba

Použijte 1 lahvičku přípravku Androlis. Postačí až pro 15 ptáků. Řiďte se pokyny na štítku a nechte predátory dělat svou práci.



Prevence

Obsah lahvičky vyměňujte každých 8 týdnů pomocí doplňovacích sáčků Androlis, abyste zabránili propuknutí nákazy.

Čmelík kuří



Identifikace čmelíka kuřího - *Dermanyssus gallinae*

Čmelík kuří je velmi běžný na drůbežích farmách v domácích chovech slepic a také v ptačích hnízdech. Stejně jako komáři se i tyto roztoči živí krví svých hostitelů.

- Velikost: 0,5 - 4 mm
- Barva: červená, černá, šedá nebo bílá, v závislosti na životní fázi



Kde se schovávají?


Roztoči se shlukují ve štěrbinách v kurníku.

Kdo jsou jejich predátoři



Androlaelaps casalis v produktu Androlis

Tito predátoři se přirozeně vyskytují ve všech ptačích hnízdech. Androlis obsahuje tyto predátory, kteří jsou Vaši nejlepší spojenci v boji proti zamoření čmelíky v kurníku. Lze použít i preventivně.




1

Propíchněte střed víčka difuzéru.



2

Aby mohli predátoři snadněji vylézt z láhve ven, připevněte láhev na klip.



3

Pro nepřetržitou ochranu slepic před čmelíky je vhodné po 8 týdnech dosypat do stávající láhve další roztoče.

Problémy související s výskytem čmelíka v chovu slepic



Výskyt na slepicích

Sáním krve svých hostitelů způsobují roztoči u ptáků stres, nadměrné čištění peří a anémii.



První příznaky

Můžete pozorovat pokles snůšky vajec a také skvrny na vejcích.



Další dopad

Roztoči jsou také přenašeči nemocí.

K dispozici v těchto velikostech:

Androlis M a náhradní sáček

1-15 slepic
1 láhev
10 000 predátorů



Androlis XL

30-100 slepic
2-4 láhve
60 000 predátorů



Androlis L

15-30 slepic
1-2 láhve
20 000 predátorů



Androlis XXL

100-200 slepic
4-8 lahví
100 000 predátorů



Jak často bych si měl/a doplňovat lahvičku Androlis?

- Na jaře a v létě: každých 6-8 týdnů, protože podmínky jsou příznivější pro množení škůdců.
- Na podzim a v zimě: čmelíci mohou vydržet celý rok bez jídla. Doplňujte lahvičku s přípravkem Androlis každých 8-12 týdnů.




Působí preventivně a kurativně



Biologická ochrana bez chemie



Efektivně účinkuje 8 týdnů



Obsahuje 10 000 dravých roztočů



Balení je na 15 slepic

Náhradní sáček Androlis pro nepřetržitou ochranu před čmelíky

Pro optimální ochranu je třeba pravidelně doplňovat hladinu predátorů. Jednoduše vysypte obsah sáčku do lahvičky Androlis.

1 sáček
=
1 kurník



Doplňkové produkty pro kompletní kontrolu populace čmelíků v chovech drůbeže.

Appic'ure

Pro krátkodobé použití. Po smíchání s krmivem Appic'ure odpuzuje a oslabuje roztoče.



InsectoSec Liquid

1 litrové balení čisté křemeliny. Aplikace na povrchy, bidla a snůšková hnízda, kde se čmelíci schovávají

Androlis

