

Toxicita přípravků vůči dravému roztoči T. pyri

* použitelné bez omezení;

(*) použitelné s omezením, až od 2. roku od introdukce dravého roztoče, minimálně 2x za vegetaci;

! vysoko toxicický;

? doposud netestované – nepoužitelné

| Přípravek | Účinná látka |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Akaricidy | |
| * Kumulus WG – 1,5-2% | síra |
| * Nissorun 10 WP – 0,07 | hexythiazox |
| * Sanmite | pyridaben |
| ! Masai | tebufenpyrad |
| Insekticidy | |
| ! Alfametrin, Vaztak Active; Athalic 50 ME | alpha-cypermethrin |
| * Alneto | indoxakarb |
| * Lepinox Plus – 1kg | <i>Bacillus thuringiensis, kurstaki</i> |
| (?) Calypso SC, Nymph, CLOPRID 480SC | thiacloprid |
| ! Decis Mega, Decis 15 EV, Rhago 50 EW | deltamethrin |
| * Dimilin 48 SC - 0,02%; KeMiChem-Diflubenzuron 480 SC | diflubenzuron |
| ! Fury 10 EW; Agrosales – zetacypermethrin, AV Cyper, BEC Zetacyp, Faraon 10 EW, Frontess 10 EW, KeMiChem-ZETA-CYPERMETHRIN 100 EW | zeta-cypermethrin |
| * Insegar 25 WP | fenoxy carb |
| * Integro, Unito SC | methoxyfenozide |
| ! Karate 2,5 Zeon 050 CS, Karate se Zeon technologií 5 CS, BEC Lamcy, Agrosales – Lambdacyhalotrin, KeMiChem-Lambdacyhalothrin 50 CS, I-50 CS; ODRC-Lambdacyhalothrin 50 CS; RC-Lambdacyhalothrin 50 CS; Samuraj; Streetfighter 5 CS; Lambda 50 SC | lambda-cyhalothrin |
| (?) LEGEND, Quinoxyfen - IQ | chinogafen |
| (?) Mythos 30 SC | pyrimethanil |
| * Nissorun 10 WP – 0,07 | hexythiazox |
| (*) Reldan 40 EC | chlorpyrifos-methyl |
| * Síra BL | síra |
| * Solfex | síra |
| ? Steward, Pilot | indoxacarb |
| * SpinTor | spinosad |
| (?) Coragen 20 SC | chlorantraniliprol |
| (?) Warrant 700 WG | imidacloprid |
| (?) Sanmite 20 WP | pyridaben |
| Fungicidy | |
| (*) Acrobat MZ, Acrobat Plus WG, AV Acro WG, Euro-Chem Cozep | dimethomorph, mancozeb |
| * Aliette (ambl) | fosetyl-Al |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| * Aliette Bordeaux | fosetyl-Al, oxichlorid mědi |
| * Captan 50 WP – 3 kg, Merpan 50 WP – 3 kg, 80 WG – 3 kg | captan |
| * Champion 50 WP – 5 kg; Funguran-OH 50 WP, Kocide 2000 | hydroxid měďnatý |
| ! Clarinet 20 SC | fluquinconazole, pyrimethanil |
| * Cuproxat SC – 5 l | síran měďnatý |
| (?) KeMiChem-Cu-Flo | síran měďnatý - zásaditý |
| (*) Curzate M WP, Curzate Gold, Zetanil WG | cymoxanil, mancozeb |
| (*) Dithane M 45, Manfil, Anthra, Novozir MN 80 New | mancozeb |
| * Discus – 0,2 kg; Discus 500 WG, AV Kreso, Agrosales – Kresoxin, Kresox 50 WG | kresoxim-methyl |
| * Falcon 460 EC | tebuconazole, triadimenol, spiroxamine |
| * Flowbrix | měď |
| * Folpan, 80 WG | folpet |
| *IQ-Crystal, LEGEND | quinoxyfen |
| ? Domark | tetraconazole |
| * Karathane New LC 50 – 0,05 % | dinocap |
| * Kocide | měď |
| * Kumulus WG – 3-6 kg | síra |
| * Kuprikol 50, 250 SC - 0,5 %, Korzar | oxichlorid mědi |
| (*) Polyram WG – 0,2-0,3% | metiram |
| (*) Cabrio Top | metiram, pyraklostrobin |
| * Quadris 0,8-1 kg | azoxystrobin |
| (*) Ridomil Gold MZ Pepite | mancozeb, metalyxyl-M, |
| * Rovral Flo - 0,2 % | iprodione |
| *Score 240 EC; Difo, | difenoconazole |
| * Solfobenton DC – 20 kg | oxid siřičitý |
| * Syllit | dodine |
| (*) Systhane 12 EC, Talent, AV Myclo | myclobutanil |
| * Teldor 500 SC | fenhexamid |
| * Thiram Granuloflo | thiram |
| * Topas 100 EC - 0,025 % | penconazole |
| *Zato 50 WG, Flint, Monili 50 WG | trifloxystrobin |

Adjuvant

| | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| (?) Adaptic | polyakrylamid, Síran amonné |
| (?) Velocity | Polyether-polymethylsiloxan-kopolymer, Methylester řepkového oleje |

Repelent

(?) Trico

ovčí tuk